

把车停在路边,小心车被虫咬穿

秋季是虫媒伤害的高发季节,你应该知道这些防虫知识

潇湘晨报·晨视频记者范盛杰 综合报道

前两天,长沙天气晴好,你洗好换季的衣服了吗? 如果还没洗好,那可要注意,根据长沙市气象局预报,随着一股冷空气的影响,接下来将进入一段时间的“阴雨模式”,本周剩下的几天大多有雨。出门之前,记得提前收好衣物,关紧门窗。

不过,晾晒的衣物能避开长沙的秋雨,车和房就难躲了。秋季是虫媒伤害的高发季节,哪些虫子可能会给你的生活带来不适感? 不妨了解这些知识,花点时间为房、车做好防虫准备。

铁口铜牙小地老虎,行道树下出没中

近期,多地有车主在社交平台发帖表示,自己的爱车莫名奇妙出现了一个个小圆洞,一些装饰条、电线护套等塑料部件,也出现了细密的啃咬痕迹。这些小洞从何而来? 不少网友认为,罪魁祸首是一只“虫子”。

专家表示,从目前网友拍到的虫体特征来看,这些“嫌疑虫”很可能是一种名为小地老虎的夜蛾科昆虫的幼虫,是一种主要危害玉米、豆类等多种作物幼苗的害虫。

原本啃食植物的幼虫,为何会啃咬汽车? 专家介绍,这可能与它的生活习性有关。幼虫进入老熟阶段后,需要寻找适合化蛹的隐蔽场所,而在城市环境中,一些天然的化蛹场所相对有限,汽车上的缝隙和部分塑料部件,可能成为它探索和寻找藏身处的对象。

上海师范大学生命科学学院副教授蒋韦斌介绍,一般来讲昆虫化蛹必须找

理想的环境,比如说树干的缝隙、朽木。但是在城市中,不是每个幼虫个体都能找到理想环境的。汽车上塑料的质感、硬度都跟树木比较相似,所以虫子就在上面“打孔”,准备去找理想的化蛹场所。

据介绍,这类幼虫拥有较为锋利的咀嚼式口器,可以直接咬食作物幼苗的茎基部,甚至将幼苗咬断。那么,这种虫子会咬人吗? 专家介绍,绝大多数夜蛾幼虫都是无毒的,也不会主动攻击人,因此无需过分担忧。但经常在户外停车的朋友仍然需要警惕自己的爱车被昆虫啃咬。尽量不要长时间将车停放在虫害明显的树木下。

栎树在长沙十分常见,在马路边、小区内都能看到。但是,把车停在栎树下,有一定的风险。“栎树的叶子是羽状的复叶,果实是呈灯笼状的,尽量不要把车停在栎树下。如果是车位在栎树下,建议用一件车衣罩上,尽量避免虫啃车的现象。”蒋韦斌说。

“臭”只是臭屁虫最温柔的攻击手段

臭屁虫,学名椿或椿象,俗称花大姐、屁巴虫、臭板虫、臭大姐、臭姑娘、放屁虫、枇杷虫、香舌虫等。

如果你以为臭屁虫的危害只会“放臭屁”,未免有些小瞧它了。

臭屁虫最有力的防身武器就是它头部有个腺体,能分泌喷射出恶臭的毒液或毒气。这种恶臭气体或液体沾染植物、水果或叶片都会留下这种臭味,闻之

令人作呕,故而得“臭屁虫”此大名。其毒液成分很复杂,目前已知的是含有多酶类,如蛋白溶解因子、神经毒因子等。臭屁虫受到袭扰会喷出毒液或毒气,如果溅到眼睛或皮肤上可引起刺痛、红肿、瘙痒、流泪等刺激性症状。

臭屁虫还会叮咬人,被叮咬的皮肤可出现红斑或丘疹、瘙痒、疱疹或坏死,甚至出现全身中毒症状,少数人可引起过敏反应,表现为胸闷、四肢麻木、呼吸困难、烦躁、昏迷等,如抢救不及时可造成死亡。我国已报道4例被锥椿叮咬致过敏的病例,其中1人死亡。2019年云南出现1例被椿叮咬出现横纹肌溶解的病例。

这两天,长沙会有一次降温过程。如果没有关好纱窗、堵好空调管道,不小心留了个缝,可就要小心喜欢寻找暖和地方越冬的臭屁虫不请自来了。



▲栎树是小地老虎等昆虫的“快乐老家”。 图/文旅长沙
►车上被小地老虎咬出的小圆洞。图/新华社

蚊子也有“雪盲症”

秋天来了,蚊子为什么更凶了? 因为蚊子从卵、幼虫(孑孓)、蛹到成虫,最适宜温度是25-30℃,低于10℃基本不活动,低于5℃会大量死亡。

长沙市气象台预报,14日到16日,长沙的日最高气温将回落到30℃以下。也就是说,这几天的长沙,正是最适合蚊子活跃的时期。

近期,长沙市卫生健康委提醒,目前仍处于登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病的流行期。防控基孔肯雅热和登革热注意以“清积水、灭成蚊、防叮咬”为核心,采取科学灭蚊措施,有效降低蚊媒密度,阻断疾病传播。

基孔肯雅热和登革热主要通过伊蚊(如白纹伊蚊、埃及伊蚊)传播,需从源头控制蚊媒孳生。

从形态上看,白纹伊蚊背部有一道明显的白色纵纹,而埃及伊蚊背部有独特的“竖琴”状白色斑纹。从分布区域

看,白纹伊蚊在我国分布范围较广,而埃及伊蚊仅分布在南方局部地区。两者都喜欢在小型积水中繁殖,攻击性强,可传播登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等多种疾病。

清理各类积水是消灭蚊虫的关键步骤。要注意检查并清除室内外小型积水,包括花盆托盘、瓶罐、冰箱底部接水盘等。同时应清除垃圾、杂物,减少蚊虫栖息场所,并定期疏通地下室、屋顶的排水系统,防止积水。

关于蚊子还有一些冷知识。蚊子具有趋暗性,喜欢在黑暗或弱光环境下活动。所以,穿深色的衣服更容易让它们“叮”上你。此外,蚊子主要依靠人体散发的二氧化碳、体温和汗液里的乳酸来定位叮咬吸血目标。人体新陈代谢快、呼出二氧化碳多、体温高或爱出汗,对蚊子的吸引力就特别大,比如青少年、孕妇、体型偏胖者、刚运动完的人等。

➤ 链接

如何精准拍死一只蚊子

你是否有过这样的经历:深更半夜,你睡得正迷糊,耳边突然响起嗡嗡声;恼怒地起床准备打蚊子,却发现怎么也打不中。

如果有,那你一定思考过这个问题——如何打蚊子才能给出“致命一击”?

蚊子和苍蝇一样,属于“双翅类”,也就是只有两个翅膀。双翅类的蚊、蝇的翅膀短促、有力,虽然最高速度无法和四只翅膀的蜻蜓等比较,但飞行非常灵活,能够轻松地进行急转弯、悬停爬升等高难度动作。

所以,当你打算对蚊子动手时,蚊子能迅速感受到空气的细微振动,并以超快的速度做出反应。这也是为什么很多时候,明明已经第一时间就拍蚊子了,还是拍不到。此

外,蚊子的飞行走位非常难以捉摸,这也让想要精准拍死它们变得更难。

那如何精准拍死一只蚊子?

第一步,双手要上下摆好,手指微微张开,可以减少阻力。这是因为蚊子在飞行的时候身体是保持上仰的,这时它们的“垂直机动性”(爬升飞行的能力)会更强一些,而“水平机动性”(左右盘旋飞行的能力)稍差一些。当你用鼓掌的姿势左右开弓拍蚊子,它们只要向上爬升就可以轻松地躲开你的攻击。

第二步,拍的时候要要做到稳、准、狠。锁定蚊子位置后尽量让它保持在手掌的中间部位,不要在拍的时候手掌位移过大,同时不宜用力过大,避免造成较大的空气扰动。

顺便记得拍下以后合着手掌搓一搓,确保蚊子被彻底打死。

需要注意的是,寻找蚊子的时候尽量不要开室内的顶灯。过强的光线会让蚊子藏起来,不利于搜索蚊子。可以打开床头的台灯等亮度不是很高的照明设备,同时用手电筒搜索探照,蚊子落在墙上时会很容易留下影子,更容易发现。



臭屁虫的卵。
图/长沙发布